

## 《 児童・生徒の定期予防接種一覧 》

種 類	対 象 年 齢	標準的な接種年齢	接種間隔と回数等	勸 奨 時 期	
日本脳炎 (第2期)	9歳以上 13歳未満	9歳	1回	小学校4年生	
二種混合 (ジフテリア・ 破傷風)	11歳以上 13歳未満	11歳	1回	小学校6年生	
ヒトパピローマ ウイルス (HPV) 感染症 (子宮頸がん)	サーバリックス (2価)	小学校6年生 ～高校1年生 相当の女子	13歳となる日の 属する年度 (中学校1年生)	<p>&lt;標準的な接種方法&gt;</p> <p>1回目から1か月あけて 2回目を接種。</p> <p>1回目から6か月以上あけて 3回目を接種。</p>	中学校1年生 ・ 高校1年生で 接種が未完了 の人
	ガーダシル (4価)			<p>&lt;標準的な接種方法&gt;</p> <p>1回目から2か月あけて 2回目を接種。</p> <p>1回目の接種から6か月以上あけて 3回目を接種。</p>	
	シルガード 9 (9価)			<p>&lt;標準的な接種方法&gt;</p> <p><u>3回の場合</u></p> <p>1回目から2か月あけて 2回目を接種。</p> <p>1回目の接種から6か月以上あけて 3回目を接種。</p> <p><u>2回の場合</u></p> <p>1回目から5か月以上の間 隔を置いて2回目を接種。</p> <p>※2回接種は、1回目の接種が 15歳に至るまでの間に 接種した者に限る</p>	