

《 乳幼児の定期予防接種一覧 》

種類	対象年齢		標準的な接種年齢	接種間隔と回数等			
ロタウイルス	ロタリックス (1価)	生後6週0日後～24週0日後までの間	生後2月～出生14週6日後までに接種開始	27日以上	初回接種は、ロタリックス、ロタテックともに生後6週0日～14週6日後までに接種	2回	
	ロタテック (5価)	生後6週0日後～32週0日後までの間				3回	
肺炎球菌	初回	生後2月～5歳に至るまで	生後2～7月に至るまで	27日以上	開始が生後2～7月に至るまで	1～4回	接種時期により接種回数が異なります
	追加		1歳～1歳3月に至るまで		初回終了後60日以上	開始が生後7月～1歳に至るまで	
					開始が1～2歳に至るまで	2回	
					開始が2～5歳に至るまで	1回	
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)	1期初回	生後2月～7歳6月 に至るまで	生後2月～生後7月 に至るまでに開始し、20～56日 までの間隔をおいて	20日以上の間隔をおいて3回			
	1期追加		1期初回接種終了後 から6～18月までの 間隔をおいて	1期初回接種（3回）終了後、 6月以上の間隔をおいて1回			
B型肝炎	1歳に至るまで		生後2～9月 に至るまで	3回（27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回）			
BCG	1歳に至るまで		生後5～8月 に達するまで	1回			
麻しん 風しん	1期	1歳～2歳 に至るまで		1回			
	2期	5～6歳の 小学校就学前1年間		1回			
水痘	1回目	1歳～3歳 に至るまで	生後12～15月 に至るまで	1回			
	2回目		初回接種後6～12 月 に至るまで	3月以上の間隔をおいて1回			
日本脳炎	1期初回	生後6月～7歳6月 に至るまで	3歳	6日以上で2回			
	1期追加		4歳	6月以上の間隔をおいて1回			